

Wirkstoff	Verdünnung	Dosierung	Indikation	Bemerkungen
Amynin		1ml – 3ml pro Tier und Tag	geschwächte Tiere, Nahrungsergänzung	
Augmentan	2,1g Pulver auf 14ml mit Wasser auffüllen	0,2ml / kg KG	Antibiotikum, bakterielle Infektion der Lunge/ Atemwege, Blaseninfektion	
Babix		einige Tropfen auf ein feuchtes Tuch	Erleichterung der Atmung	
Baycox		20mg/ kg einmalig	Kokzidienbefall	
Baytril	2,5%	0,05ml – 0,25ml / 200g KG	Antibiotikum, bakterielle Infektionen	0,25ml / kg KG max. pro Tag
Betaisodona		bei Bedarf die Wunde eincremen bzw. spülen	Desinfektionsmittel für Wunden	
Bisolvon		0,5mg/ kg KGW	Zur Lösung festsitzenden Schleims in den Atemwegen	
Canina PetVital Bio Insect Shocker		Hautbereiche jeden 2. Tag satt einsprühen	Milbenbefall, Ektoparasiten, ohne Nebenwirkungen	
Combi Flora	Kapsel öffnen und entleeren, mit Honigwasser suspendieren	eine Kapsel pro Tier und Tag	Aufbau der Darmflora	
Convenia		8mg/ kg KGW subkutan	Langzeitantibiotikum bei bakteriellen Infektionen	
Dectomax	10%ige Lösung mit lipider Vitaminlösung oder sterilem Sasamöl 1 : 30 verdünnen	0,3mg/ kg KGW, 0.9ml/ kg subkutan Fliegenlarve/ - Eier direkt satt auftupfen	Endoparasitenbefall, z.B. Capillaria, Crenosoma, Ektoparasiten, z.B. Flöhe, Zecken, Milben, Fliegenlarven/-eier	
Diflucan	10,5g Trockensaft mit 12ml Wasser anrühren	0,5ml Suspension/ kg KGW, zweimal täglich entspricht 10mg/ kg KGW und Tag	Oberflächliche und Systemische Mykosen, z.B. Trichophyton, Candida	
Elotrans	ein Beutel auf 200ml Wasser	zum Auffüllen des Flüssigkeitshaushalts so viel wie möglich	Bei Dehydrierung, wenn das Tier noch oral aufnehmen kann	

Flubendazol	5% Pulver	25mg/ kg KG, 1g Pulver/ kg KGW unter das Futter mischen	Endoparasiten des Darms	
Frontline Spray		bei Bedarf 2- 3 Spühstöße, nicht in die Augen	Flohbekämpfung	
Humatin	1 Flasche mit 5ml Wasser anrühren	150mg/ kg, 0,75ml/ kg KGW	Kryptosporidien	
Imaverol	0,2%ige Lösung ansetzen (Handelslösung 1:50 mit Wasser verdünnen)	Ganzkörperbad jeden 2.Tag	Behandlung oberflächlicher Mykosen	
Itraconazol	z.B. Sempera Liquid	0,5ml Suspension/ kg KGW, zweimal täglich entspricht 10mg/ kg KGW und Tag	siehe Diflucan	
Karsivan	Tabletten zerstoßen, in Honigwasser suspendieren	max 50mg/ kg und Tag	Förderung der Durchblutung, Schädel- Hirn Trauma	
Kepinol		>500g, 20mg/ Igel 2 x täglich < 500g, 40mg/ Igel 2 x täglich	Sulfonamid, Infektionen der Lunge/ Atemwege, des Mundes/ Rachens	
Kohletabletten	1 Tablette in 5ml Honigwasser suspendieren	1 – 2 Tabletten täglich	Bindung von Giftstoffen im Darm bei bakteriellen Infektionen	
Lasix		2mg/ kg täglich	Entwässerung bei Ödemen	
Luminaletten	¼ Tablette in Honigwasser suspendieren	¼ Tablette	Beruhigung/ Epilepsie	
MCP Tropfen		0,5mg/ kg KGW, 0,13ml/ kg	Übelkeit/ Erbrechen	
Metacam/ Rheumocam		0,1ml/ 100g KGW als Schmerzmittel	Schmerzmittel/ Knochenbrüche	
Metronidazol		25mg/ kg KG	Infektionen mit Anaerobiern und Protozoen	
Novalgin		50mg/ kg KG max.	starkes Schmerzmittel nach OP und Brüchen	
Neopredisan	Handelsform 1 : 10 mit Wasser verdünnen	Gehege/ Box satt aussprühen/ -wischen	Desinfektionsmittel für Gehege und Boxen, tötet alle Viren, Bakterien, Würmer und deren Eier zuverlässig	
Panacur		<500g KG 5mg/ 100g KG	Entwurmungsmittel, Endoparasiten	kann vorübergehende Appetitlosigkeit verursachen
Reconvales Tonikum		>500g KG 10mg/ 100g KG so viel wie genommen wird	Nahrungsergänzung	
Ringer Lösung		je nach KGW 5ml – 10ml subkutan alle 30 min.	bei dehydrierten, schwachen Tieren, wenn oral die Aufnahme verweigert wird	
Rivanol	0,5g / 100ml Wasser	0,5%ige Lösung als Bad	Desinfektion der Haut, auch bei Pilzbefall	
SAB Simplex Tropfen		0,1ml/ 100g KGW	Blähbauch	

Sterilium Virugard		Hände zur Desinfektion satt einreiben	Desinfektion der Hände, Vermeidung von Ansteckung durch Bakterien und Pilze
Surolan		Auf befallene Stellen 2 x täglich satt auftragen	Antimykotikum
Vitamin B Komplex		1 Messerspitze pro Igel alle 2 Tage	Nahrungsergänzung, Vorbeugung von Lähmungen
Wasserstoffperoxid		5%ige Lösung zur Desinfektion von Fütterungsgeräten einwirken lassen	Desinfektion von hitzeempfindlichen Geräten